

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

Medidas precautorias generales:

Por el tipo de envase que impide el contacto con el usuario, no se describen precauciones especiales

Riesgos Ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico para aves.

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico para peces.

Tratamiento de remanentes: Si el producto no fuera usado en su totalidad, guardar el remanente en su envase original herméticamente cerrado y en lugar seguro.

No trasvasar a otro recipiente.

Tratamiento y Método de destrucción de envases vacíos: Verificar que estén totalmente vacíos. Posteriormente disponerlos en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos. No incinerar a cielo abierto.

Almacenamiento: conservarse en su envase original cerrado herméticamente, en lugar seco y fresco; con buena ventilación y lejos del fuego y fuentes de calor hasta su aplicación. De lo contrario, puede perder efectividad.

Derrames: No Corresponde.

Primeros auxilios: En caso de intoxicación llamar inmediatamente al médico. Retirar al afectado de la fuente de contaminación, quitarle la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo afectadas. No suministrar nada por la boca a personas inconscientes. En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE IV. PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. CUIDADO. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

Síntomas de Intoxicación Aguda: No se conocen.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Av. Illía s/n Palomar Bs. As. Tel (011) 4654-6648 y 4658-7777.
Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed. Tel.: (011)4300-2115 y 4307-5842.
Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351(C1120AAF) Cap. Fed. Tel.: (011) 5950-8806/8804
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666.
Centro de consultas toxicológicas TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727

FEROMONA

ISOMATE-C PLUS LL FLEX

Dispenser

COMPOSICIÓN:

mezcla dodecadienoles.....88,67 g
inertes c.s.p.....100 cm3

**LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO
ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

Inscrito en SENASA con el N° 37236

LOTE N°:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

Inflamable: de 3° categoría.

Origen: Japón



AGRO ROCA S.A.
Avda. Roca esq. México
Tel: 02984-422091-422327
Fax: 02984-430270
(8332) Gral. Roca - Río Negro
agroroca@fibertel.com.ar
SAGPyA - SENASA: A00135 -

Generalidades: ISOMATE-C PLUS LL Flex es una Feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Los vapores que se desprenden de los difusores, confunden a los machos evitando su apareamiento con las hembras, consecuentemente no hay postura de huevos cuyas larvas ocasionen daño a las frutas.
ISOMATE-C PLUS LL Flex controla única y exclusivamente *Cydia pomonella*.
ISOMATE-C PLUS LL Flex no daña a la fauna útil de predadores.
ISOMATE-C PLUS LL Flex no deja residuos en la fruta y por lo tanto se puede utilizar en cultivos ecológicos.

Condiciones a tener en cuenta antes de aplicarse:

- 1) La población de Carpocapsa en el cultivo debe ser baja
- 2) En cultivos aislados o con cultivos perimetrales no tratados
- 3) El mejor control se obtiene en lotes grandes Tamaño mínimo: 2 has.
- 4) No aplicar en cultivos implantados, pendientes o terrazas.

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Dosis/Ha	Plaga	Aplicación
Manzano Peral Nogal	800 - 1000 difusores	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	A la caída de los pétalos.

Los vapores se desprenden de los difusores por más de 180 días.

Instrucciones de uso: Colocar el difusor en la parte más alta de la planta y en forma simétrica para cubrir todo el lote. La cantidad de difusores por árbol depende de su densidad.

El difusor de ISOMATE-C PLUS LL Flex se coloca en forma manual, colgándolo dentro de las ramas secundarias o brindillas. Reforzar la fila perimetral a fin de contrarrestar el efecto de difusión de los bordes. Los difusores se eliminan con la poda y junto con las ramas se pican e incorporan al suelo.

Preparación:

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Monitoreo de la plaga: Revisar periódicamente el monte luego de la colocación de ISOMATE-C PLUS LL Flex, observando brotes y colocando 1 a 3 trampas con feromona o de luz por hectárea.

La ausencia de caídas de Carpocapsa en las trampas es buen indicio de eficacia del tratamiento pero no es suficiente prueba. Realizar muestreos de brotes y frutos semanalmente.

Restricciones de uso: Exento de periodo de carencia.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia

NOTA: por medio de pruebas cuidadosas, se demostró que el producto al ser aplicado según nuestras instrucciones, es eficaz para los fines recomendados. La firma se responsabiliza por las condiciones fisico-químicas del producto. Sin embargo, dado que la aplicación esta afuera de nuestro control y no podemos prever las condiciones de empleo, no aceptamos responsabilidad alguna por ningún daño eventual que pueda producirse a causa del uso del producto distinto del indicado en este rótulo.



CUIDADO

