

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

Medidas precautorias generales:

Evitar la inhalación, el contacto con la piel, ojos, y la contaminación de los alimentos, usar ropa apropiada, sombrero, careta antiparras, guantes y botas de goma, durante su aplicación.
Después del tratamiento, lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No beber, comer o fumar durante su aplicación.
No espolvorear contra el viento. Lavar la ropa contaminada con agua caliente y jabón.

Riesgos Ambientales: Prácticamente no tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas. El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete.

Tratamiento de remanentes: Si el producto no fuera usado en su totalidad, guardar el remanente en su envase original herméticamente cerrado y en lugar seguro. No trasvasar a otro recipiente.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: Verificar que estén totalmente vacíos, practicar la técnica del triple lavado e inutilizarlos por rotura. Posteriormente disponerlos en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos de plaguicidas y/o envases vacíos. No incinerar a cielo abierto.

Almacenamiento: consérvase en su envase original cerrado herméticamente, en lugar seco y fresco; con buena ventilación y lejos de alimentos, medicamentos y forrajes.

Derrames: todo derrame del producto, o de su dilución, deberá tratarse inmediatamente y absorberse con un material sólido absorbente, sin polvo, como aserrín, tierra granulada absorbente.
Los derrames, una vez neutralizados, se recogen con pala o cepillo o, de disponerse, con una aspiradora industrial y deben colocarse en tambores y enviar a sitios autorizados para su deshecho.


Primeros auxilios: si es ingerido, provocar el vomito con agua caliente y sal o solución de mostaza, repitiendo hasta que el vomito sea claro. Por contacto con la piel u ojos, enjuagar con abundante agua limpia. Llamar al médico.

Advertencia para el médico: Producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de Intoxicación Aguda: aplicado localmente, puede causar irritación cutánea. Moderado estimulante peristáltico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Av. Illia s/n Palomar Bs. As. Tel (011) 4654-6648 y 4658-7777.
Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed. Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842.
Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351(C1120AAF) Cap. Fed. Tel.: (011) 5950-8806/8804
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666.
Centro de consultas toxicológicas TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727
NEUQUEN: Hospital Regional. Tel. 0299 4431- 474 // 479.



Polvo Mojable

COMPOSICION:

azufre 80 g
humectantes, dispersantes e inertes, csp 100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 30.304

Lote N° vease en el envase

Fecha de Vencimiento Oct 2013

Industria Argentina Contenido Neto **25 kg**

No Inflamable



AGRO ROCA S.A.C.I.A.e I.
Plaguicidas - Fertilizantes
Av Roca esq. México
Tel: (02941) 430270
(8332) Gral. Roca - Río Negro

Empresa Inscrita en SENASA Y SAGPyA: A00135

Generalidades

TIOKOLL 80, es un funguicida a base de azufre coloidal mojable, constituido por una mezcla de partículas de azufre de tamaño diverso.
Las partículas pequeñas actúan rápida e intensivamente, las mayores tienen un efecto más constante y duradero.

TIOKOLL 80, aplicado con regularidad, posee asimismo un efecto secundario contra los ácaros.

Instrucciones para el uso

Preparación: TIOKOLL 80, se mezcla con agua. Prepárase primero una pasta cremosa con la cantidad requerida de TIOKOLL 80 y poca agua. Agréguese ésta al resto en el tanque de la pulverizadora y con el sistema de agitación en funcionamiento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Debe usarse con pulverizadores manuales o motorizados provistos de sistema de agitación.

CULTIVO	PLAGA	DOSES g/HA	MOMENTO DE APLICACION
VID	Oidio (Uromyces necator)	100 200-300	En aplicaciones preventivas cada 2 semanas desde que los brotes tienen 10-15 cm de longitud y no se observan signos de la enfermedad. Al aparecer los signos de la enfermedad.
MANZANO PERAL	Oidio (Podospheara leucotricha)	100-600 200-300 100-200	En prefloración. A caída de pétalos. En pulverizaciones posteriores. Las variedades sensibles al azufre se deberán tratar solamente en prefloración.
DURAZ NERO	Oidio (Sphaerotheca paucosa)	200-300	Tra aplicación: Al hincharse las yemas foliares. 2da aplicación: Al aparecer los signos de enfermedad.
CITRUS	Acaro de la lepra (Brevipalpus incomatus) Acaro del nudo (Phyllocoptruta oleivorus) Acaro del piquete (Aceria citrana)	200-300 100-200	Como preventivo. 1) En prefloración. 2) Después de la caída de los pétalos.
PERNO MELÓN ROSAL	Oidio (Erysiphe cichoracearum) Oidio (Sphaerotheca pannosa)	200-300 250	Al observar los primeros signos. Comenzar los tratamientos al iniciarse la brotación, repitiendo cada 2 semanas.

Restricciones de uso: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir en:

- Frutales de carozo y pepita 28 días
- Citricos y vid 30 días
- Hortalizas en general 7 días
- Rosal exento de restricción

Se recomienda realizar la aplicación de TIOKOLL 80 durante las primeras horas de la mañana, suspendiendo los tratamientos cuando la temperatura sea superior a 25°C. Dejar transcurrir un plazo de 30 días entre aplicaciones de azufre y aceites.

No deben efectuarse tratamientos durante la época en que los frutos toman color (manzanas y uvas). En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad

El TIOKOLL 80 se puede mezclar con otros funguicidas, insecticidas y acaricidas.

Al preparar el caldo no añadir el producto fitosanitario hasta poco antes de efectuar la pulverización.

El TIOKOLL 80 es incompatible con los dinitrocreosoles y aceites.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico si se aplica siguiendo las recomendaciones de este marbete.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Responsabilidad Legal: Agro Roca S.A. garantiza la calidad de este producto, pero, en virtud de que su aplicación está fuera de su control, no acepta ninguna responsabilidad por perjuicios que pudieran producirse por el uso del producto distinto a lo indicado en este rótulo.

LEVEMENTE TOXICO - CUIDADO